

ZASADY ZABEZPIECZANIA GOSPODARSTW UTRZYMUJĄCYCH ŚWINIE — pozostających poza urzędowymi strefami zagrożenia i występowania ASF




Zakaz obsługi świń przez osoby, które przed upływem 72 godzin uczestniczyły w polowaniu lub odłowie zwierząt łownych.

W przypadku utrzymywania świń w systemie otwartym, nakaz budowy podwójnego ogrodzenia wokół wybiegu (wysokość min. 1,5 m), związanego na stałe z podłożem.

Nakaz zabezpieczenia budynków przed dostępem innych zwierząt (osobne, zamknięte pomieszczenia, oddzielne wejścia, bez przejść do pomieszczeń dla innych kopytnych zwierząt gospodarskich).

Nakaz prowadzenia rejestru obecności wszystkich osób w pomieszczeniach, w których utrzymywane są świnie.

Nakaz prowadzenia rejestru wszystkich środków transportu do przewozu świń, wjeżdżających każdorazowo na teren gospodarstwa.



Zakaz obsługi świń przez osoby, które wykonują te same czynności w innych gospodarstwach.

Nakaz prowadzenia i aktualizowania spisu świń z podziałem na prosięta, warchlaki, tuczniki, lochy, loszki, knury i knurki.

Nakaz wyłożenia i stałego utrzymywania mat o długości min. 1 m i szerokości całego wejścia, przed wejściami do pomieszczeń dla świń.

Nakaz stosowania podstawowych środków higieny:
– mycia i odkażania rąk,
– czyszczenia i odkażania obuwia, narzędzi i sprzętu,
– stosowanie oddzielnej odzieży i osobnego obuwia przy obsłudze świń.

Nakaz zabezpieczenia pasz przed dostępem zwierząt.

**Pomorski Wojewódzki Lekarz Weterynarii APELUJE
do hodowców i właścicieli gospodarstw utrzymujących trzodę chlewną.**

Szanowni Państwo!

ASF, czyli afrykański pomór świń - to wyjątkowo groźna, nieuleczalna, wysoce zakaźna i zaraźliwa, wirusowa choroba świń domowych oraz dzikich. ASF podlega obowiązkowi urzędowego zwalczania. **ASF nie jest groźny dla człowieka**, ale region w którym zostanie stwierdzona choroba narażony jest na **poważne straty ekonomiczne** (ograniczenia w handlu i obrocie szwiniami i wieprzowiną).

Źródłem zakażenia ASF mogą być świny domowe, świny dzikie, ale również **mięso pochodzące od zakażonych świń, dzików** oraz zakażone **produkty wyprodukowane z mięsa chorych świń i dzików**.

W związku z utrzymującym się zagrożeniem (ASF) afrykańskim pomorem świń w Polsce w tym również na terenie **województwa pomorskiego** zwracam się z prośbą o bezwzględne przestrzeganie zasad bioasekuracji:

- utrzymywanie świń **wykluczające kontakt ze zwierzętami wolno żyjącymi i domowymi** po przez odpowiednie zabezpieczenie budynków **oraz odseparowanie od innych kopytnych w gospodarstwie**, po przez utrzymywanie świń w osobnych pomieszczeniach z osobnym wejściem do budynku;
- stosowanie **pasz i ściółki w sposób wykluczający kontakt z dzikami** i zabezpieczonymi przed dostępem zwierząt wolno żyjących i domowych;
- **wyłożenie mat dezynfekcyjnych** stale nasączonych środkiem dezynfekcyjnym o wymiarach wskazanych w przepisach, w wejściach i wyjściach do pomieszczeń, w których utrzymywane są świny;
- **stosowanie odzieży i obuwia przeznaczonego tylko do obsługi świń** przez osoby wyłącznie wykonujące te czynności, które zmienia się i nakłada każdorazowo wchodząc do budynku;
- zachowanie **higieny i dezynfekcji obuwia i rąk** każdorazowo wchodząc do pomieszczeń, a także systematyczna dezynfekcja sprzętu i narzędzi w gospodarstwie;
- **prowadzenie rejestrów** wejść i wyjść osób z zewnątrz, wjazdu i wyjazdu samochodów do przewozu świń i paszy lub produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, oraz prowadzenie i aktualizowanie **spisu świń** z podziałem na grupy produkcyjne w gospodarstwie;
- nie kupowanie świń nieoznakowanych, nie zgłoszonych do rejestru, bez świadectw zdrowia świń, które mogły pochodzić z niewiadomego pochodzenia;
- nie wnoszenia na teren gospodarstwa produktów od dzików, co do których jest najmniejsze podejrzenie skażenia ASF, a po polowaniu zachowanie min. 72 godzin przed wejściem do pomieszczeń, w których utrzymywane są świny.

Wybierając środek do dezynfekcji należy zwrócić uwagę na:

1. **Spektrum działania** na drobnoustroje: produkt powinien **wykazywać działanie wirusobójcze**;
2. **Zakres temperatur** – środek dezynfekcyjny powinien być skuteczny zarówno w wysokiej, jak i niskiej temperaturze w budynku;
3. **Bezpieczeństwo działania** środka dezynfekującego: produkt powinien być biodegradowalny, nie wymagający spłukiwania, nie powinien korodować z elementami wyposażenia;
4. **Zakres stosowania**: produkt powinien służyć do dezynfekcji budynków, wyposażenia, ziemi wokół budynku, samochodów, obuwia, mat dezynfekcyjnych i basenów przejazdowych.
5. **Dezynfekcję obiektów** inwentarskich należy przeprowadzać w systemie pomieszczeń puste-pełne oraz dbać o codzienne rutynowe działania jak dezynfekcja rąk, obuwia, pojazdów itd.

Produkty biobójcze należy stosować ściśle według wskazań producenta.

Więcej informacji na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Weterynarii

<https://www.wetgiw.gov.pl/>

lub bezpośrednio **w powiatowych inspektoratach weterynarii**

Pomorska Inspekcja Weterynaryjna

<http://www.gdansk.wiw.gov.pl/>